

Infección de vías urinarias en embarazadas de la etnia zoque en una unidad rural de Chiapas, México, 2020



Fecha

2024-09-03

Autor

Gómez González, Olga

Metadatos

[Mostrar el registro completo del ítem](#)

Resumen

Identificar los factores prevalentes de infección de vías urinarias (IVU) en el embarazo de 13-45 años de edad de la etnia zoque, del Centro de Atención Rural Obstétrico (CARO) del IMSS, en el municipio de Rayón, Chiapas México, 2020. Material y método. Diseño descriptivo. Es una muestra de 156 historias clínicas perinatales de gestantes atendidas en el CARO, unidad de primer nivel en el estado de Chiapas, que fueron diagnosticadas con infección de vías urinarias (IVO). Datos de la revisión de los expedientes clínicos para ser procesados en el programa Epi Info 3.5.1. Se realizó un análisis descriptivo univariado y se calcularon porcentajes, media y moda. Resultados. El grupo de edad con más alta infección es el de mujeres en el rango de 20 a 29 años, con 46.8%, con paridad de uno, con el 67.9%. Con recurrencia de IVU de 57.1% con bacteriuria asintomática con el 75%, con rango de complicación moderada del 46%. Conclusión. Las IVU son una patología con alta morbilidad y es el factor de riesgo en el embarazo que predomina en el primer trimestre, por lo general recurrentes y presentación asintomática

URI

<https://hdl.handle.net/20.500.12753/5534>

Colecciones

- [Maestría en Salud Pública y Sustentabilidad](#)